

EPN Forum -- Pré-Conference – Planification Familiale Pré-Teste

1. Si la femme oublie de prendre la pilule, elle doit:

- a. Doit prendre la pilule oubliée dès qu'elle se souvient
- b. Il est acceptable de prendre deux pilules le même jour
- c. Utiliser une autre forme de contraception pour le reste du mois
- d. A et B sont corrects
- e. Aucune de ces réponses n'est correcte

2. Des modifications de saignements menstruels sont fréquentes chez les femmes qui utilisent:

- a. DIU
- b. Dépo-Provera
- c. pilule
- d. n'importe lequel de ces méthodes
- e. aucune de ces méthodes

3. Six semaines après l'accouchement, une femme qui allaite peut bien utiliser l'injection de progestatif seul.

- a. Vrai
- b. Faux

4. Les implants sont appropriés pour les femmes qui allaitent car ils ne contiennent

- a. pas d'estrogène
- b. pas de progestatif
- c. ni estrogène ni progestatif
- d. Aucune des réponses ci-dessus n'est correcte

5. Pour rendre la planification familiale plus acceptable et plus accessible, les programmes devraient:

- a. organiser une gamme de sites de prestation de services
- b. faire offrir certains services par les agents de santé communautaires
- c. offrir certains contraceptifs hormonaux à l'extérieur de la clinique
- d. Tous les trois

6. Les bébés conçus entre 8 et 15 mois après un accouchement sont plus susceptibles d'avoir un poids de naissance faible ou un accouchement prématuré que les bébés conçus 24 mois après un accouchement.

- a. Vrai
- b. Faux

7. Le T-en cuivre T-380A peut être employé avec efficacité pendant combien d'années ?

- a.5
- b. 12
- c.15
- d.20

8. Toutes ces méthodes contraceptives peuvent être utilisés par une femme qui allaite, commençant six semaines post-partum, SAUF:

- a. méthode de l'aménorrhée lactationnelle

- b. pilules progestatives
- c. contraceptifs oraux combinés
- d. injectable ou implant
- e. condoms

9. Les femmes qui utilisent la Méthode de Jours Fixes doivent avoir des cycles:

- a. de n'importe quelle longueur. La durée du cycle est sans rapport avec les jours fertiles
- b. de 26 à 32 jours (saignement mensuel régulier)
- c. d'une durée de 28 jours

10. Si une femme commence sa menstruation avant qu'elle ne déplace l'anneau sur la perle marron foncé, cela signifie que:

- a. Son cycle est plus court de 26 jours et elle devrait voir son fournisseur
- b. Son cycle est trop long pour utiliser la Méthode de Jours Fixes
- c. Elle a besoin de déplacer l'anneau sur la perle rouge

11. Combien de femmes dans le monde ont un besoin non satisfait de planification familiale?

- a. 10 millions
- b. 25 millions
- c. 160 millions
- d. 225 millions

12. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la sécurité des produits de santé de la reproduction?

- a. Lorsque les produits sont protégés contre le vol et le chapardage
- b. Lorsque chaque personne est capable de payer les contraceptifs de leur choix
- c. Lorsque chaque personne est en mesure de choisir, obtenir et utiliser des produits de santé reproductive de qualité essentielle dont ils ont besoin
- d. Lorsque les femmes ont la liberté de choisir les contraceptifs

13. Pour atteindre la sécurité contraceptive, les programmes doivent être en mesure de:

- a. prévoir
- b. financer
- c. procurer
- d. tous les trois

14. Les six obligations de gestion de la chaîne d'approvisionnement comprennent celles-ci SAUF:

- a. quantités appropriées
- b. état approprié
- c. clients appropriés
- d. endroit approprié

15. Dans la plupart des pays africains, la plupart des fonctions de la chaîne d'approvisionnement au niveau des installations sont effectuées par

- a. pharmaciens
- b. techniciens en pharmacie ou équivalent
- c. infirmières ou sages-femmes
- d. personnel auxiliaire

16. Laquelle des suivantes n'est pas une des quatre composantes du Cadre d'Accès ?

- a. Abordabilité

b. Assurance de qualité

c. Acceptabilité

d. Disponibilité

17. Un bon plaidoyer est né avec des capacités de plaidoyer.

a. Vrai

b. Faux